

Lip filler instructions

تعليمات خاصة بفييلر الشفاه

<p>The goal of these instructions is to encourage optimal treatment results & to minimize the risk of side effects.</p>	<p>هذه التعليمات تهدف للحصول على أفضل نتائج والمساعدة على تجنب الآثار الجانبية.</p>
<p>For 24 hours</p> <ul style="list-style-type: none"> Avoid makeup. 	<p>لمدة 24 ساعة</p> <ul style="list-style-type: none"> تجنب استخدام المكياج.
<p>For 48 hours</p> <ul style="list-style-type: none"> Refrain from strenuous exercises & heavy lifting. Use ice packs covered in thin clothes, for 30 seconds, 3 times a day. This will help with the swelling, itching, and bruising. 	<p>لمدة 48 ساعة</p> <ul style="list-style-type: none"> الامتناع عن التمارين الشاقة ورفع الأشياء الثقيلة. استخدم كمادات باردة لمدة 30 ثانية 3 مرات في اليوم. سيساعد ذلك في تقليل التورم والحكة والكدمات.
<p>For 1 week</p> <ul style="list-style-type: none"> Avoid touching, rubbing, or applying physical pressure on the treated area. 	<p>لمدة اسبوع</p> <ul style="list-style-type: none"> تجنب لمس المنطقة المعالجة أو فركها أو الضغط عليها.
<p>Eating after lip filler</p> <ul style="list-style-type: none"> Stay hydrated. Stick to foods that are easy to eat and chew. 	<p>الأكل بعد حقن فييلر الشفاه</p> <ul style="list-style-type: none"> حافظ على شرب السوائل. التزم بالأطعمة التي يسهل تناولها ومضغها.
<p>Results</p> <ul style="list-style-type: none"> You will see immediate results after lip fillers, but once the swelling goes down, the results will not look quit as pronounced. It typically takes about 3-4 weeks for the filler to settle in and achieve the final, desired look. 	<p>نتائج</p> <ul style="list-style-type: none"> ستلاحظ نتائج فورية بعد حقن فييلر الشفاه، ولكن بمجرد أن يقل التورم، لن تبدو النتائج كما هي. عادة ما يستغرق الأمر حوالي 3-4 أسابيع حتى يحقق الفييلر المظهر النهائي المطلوب.
<p>Other treatments</p> <ul style="list-style-type: none"> Take your prescription of your antibiotic or anti-viral medication. Postpone any of the following treatments for at least 2 weeks: <ul style="list-style-type: none"> Dentist appointments. Facials & exfoliating scrubs. Steam rooms & sauna & tanning beds. Other treatments in the same area such as, lasers, microneedling & chemical peels. If you must, only use paracetamol-based analgesics to reduce chances of bruising. 	<p>علاجات أخرى</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدم الوصفة الطبية بما في ذلك المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفيروسات. تأجيل أي من العلاجات التالية لمدة أسبوعين على الأقل: <ul style="list-style-type: none"> مواعيد طبيب الأسنان. جلسات تنظيف الوجه والتقشير. حمام البخار والساونا وأسرة التسمير. علاجات أخرى في نفس المنطقة مثل الليزر والابر الدقيقة والتقشير الكيميائي. إذا لزم الأمر، استخدم فقط المسكنات التي تحتوي على الباراسيتامول لتقليل فرص الإصابة بالكدمات.
<p>Follow up & consultation</p> <ul style="list-style-type: none"> You must seek medical consultation if you experience any of the following: <ul style="list-style-type: none"> Skin discoloration or pallor. Severe pain or pain that is not subsiding. Marked bruising. Noticeable or palpable mass. If you develop any new or worsened swelling, tenderness, warmth, or redness in the treated area. 	<p>المتابعة والاستشارة</p> <ul style="list-style-type: none"> يجب عليك طلب الاستشارة الطبية إذا واجهت أيًا مما يلي: <ul style="list-style-type: none"> تغير لون الجلد أو شحوبه. ألم شديد أو ألم متزايد. كدمات شديدة. تكتل ملحوظ أو محسوس. إذا تفاقم التورم أو ظهر لديك أي تورم جديد، أو ألم، أو حرارة، أو احمرار في المنطقة المعالجة، أو إذا كنت تعاني من غمازات واضحة.